

Promuovere l'allattamento

Perché è importante allattare al seno



...“L’allattamento è uno degli investimenti più efficaci ed economicamente vantaggiosi che una nazione possa fare per la salute dei suoi membri più giovani ed il futuro delle loro economie e delle società....”

... “Se non investiremo sull’allattamento, non faremo progressi per le madri ed i loro bambini/e, pagando un prezzo doppio in termini di perdite di vita e di opportunità..”

Antony Lake -Direttore Unicef 2010-2017

Allattamento nel mondo

- **A livello globale mondiale** il **48%** (2024) dei bambini/e di eta' inferiore ai 6 mesi sono allattati esclusivamente al seno con un aumento di oltre il **10% negli ultimi 12 anni.**
- **In Italia** secondo I dati 2022 della Sorveglianza dell'Istituto Superiore di Sanita'a **2-3 mesi** sono allattati esclusivamente con latte materno il **47%** dei bambini/e: 29% in Sicilia e 62% nella Provincia Autonoma di Trento; a **5-6 mesi 13%** in Sicilia e **43 %** in Trentino e Friuli Venezia Giulia,

Allattamento

- **Allattamento materno come norma.**
- **Composizione e funzioni del latte umano.**
- **Descrivere i benefici dell'allattamento al seno per madre e bambino/a.**
- **Conoscere le poche controindicazioni all'allattamento.**

Comunicato n. 64

5 marzo 2010

Ministero della Salute

UFFICIO STAMPA

ALLATTAMENTO AL SENO: PRECISAZIONI DEL COMITATO NAZIONALE MULTISETTORIALE PER L'ALLATTAMENTO MATERNO DEL MINISTERO DELLA SALUTE

Con riferimento alla frequente diffusione di notizie e articoli che hanno l'effetto di svalutare l'allattamento al seno, il Comitato intende ribadire alcuni principi di carattere generale.

I benefici relativi a questa pratica naturale sono conosciuti, studiati e supportati da evidenze molto solide. Tali benefici riconosciuti sono già numerosi ma, molti altri probabilmente, rimangono inesplorati.

L'allattamento al seno esclusivo non è tanto il "metodo ideale" bensì "la norma e il modello di riferimento rispetto al quale tutti i metodi alternativi di alimentazione devono essere misurati in termini di crescita, salute, sviluppo, e qualsiasi altro esito a breve o lungo termine" (UE)

Vale la pena di ricordare che l'allattamento al seno esclusivo per i primi sei mesi assicura una crescita, uno sviluppo ed una salute ottimali. Dopo quest'età, l'allattamento al seno, con l'aggiunta di alimenti complementari appropriati, continua a contribuire alla crescita, allo sviluppo ed alla salute del lattante e del bambino.

Una particolare attenzione deve essere volta a considerare che notizie fuorvianti o interpretazioni non puntuali e/o parziali di articoli scientifici possono condizionare i comportamenti fino a provocare la cessazione precoce dell'allattamento al seno con possibili ripercussioni sociali, economiche e di salute per le donne, i bambini e la comunità. Per quanto sopra riportato, il Comitato intende prendere le distanze da ogni tentativo di delegittimare l'allattamento al seno e auspica una particolare attenzione da parte di tutti gli organi di informazione al fine di evitare di influenzare negativamente, sia con testi che con immagini, uno dei principali determinanti della salute umana.

Che cos'è il latte materno?

- E' un TESSUTO VIVO;
- è un SISTEMA BIOLOGICO complesso;
- i suoi COMPONENTI hanno FUNZIONI MOLTEPLICI e interagiscono POTENZIANDOSI A VICENDA.

Caratteristiche generali ed essenziali:


Unicità/Inimitabilità
Specificità
Flessibilità/Variabilità

Funzioni del latte materno

- ✓ **NUTRITIVE**
- ✓ **PROTETTIVE**
- ✓ **MATURATIVE**
- ✓ **COMPENSATORIE**

Il colostro

Nutrimento perfetto per il neonato/a




Rispetto al latte maturo è:

- più ricco di immunoglobuline
- più ricco di lattoferrina
- più ricco di leucociti
- più ricco LC-PUFA
- più ricco di citochine
- più ricco di fattori di crescita
- più ricco di vitamina A
- più ricco di Na, K, Cl

Il colostro

CARATTERISTICHE DEI FATTORI BIOLOGICI DI CUI IL COLOSTRO E' RICCO	
Proteine	<i>Importanti per la crescita</i>
Anticorpi (specialmente IgA) e globuli bianchi	<i>Bolo immunologico di protezione dalle infezioni e dalle allergie</i>
Lassativo	<i>Rapida eliminazione del meconio e minor incidenza di ittero</i>
Fattori di crescita (NGF, EGF)	<i>Più rapida maturazione intestinale</i>
Vitamina A	<i>Rafforzamento delle mucose e prevenzione dalle infezioni</i>

**Allattamento al
seno & circolo
entero-
mammario,
ovvero come il
bambino
allattato al seno
beneficia
dell'esperienza
immunologica
materna**



Riprodotta da Short, Melbourne, Australia

Variabilità di composizione del latte materno

Parità

Ciclo mestruale

Età gestazionale e post-natale


Variazioni circadiane

Intervallo tra i pasti


Durata della poppata

Dieta e nutrizione materna

Latte materno maturo



Latte iniziale



Latte terminale

Composizione del latte materno

- **Proteine** ideali per quantità e rapporto fra caseina e sieroproteine (C/S)
- **LC-PUFA** (15 % dei grassi; fattori di sviluppo del SNC)
- ricchezza di **colesterolo**
- **lipasi** per la predigestione dei grassi
- assorbimento del 50 % del ferro
- presenza di **fattori antiinfettivi** (cellule vive, Ig, lisozima, lattoaderina, lattoferrina, oligosacaridi, ecc..)
- presenza di ormoni (insulina, eritropoietina, NGF, EGF, ecc...)

Carboidrati

Lattosio (68 g/L) è “l’ingrediente” principale, dopo l’acqua
(facilita l’assorbimento del calcio)

Oligosaccaridi
(>130 diversi tipi)



inibiscono il legame di patogeni ai recettori




Glicopeptidi

Fattore bifido promuove la crescita dei bifidobatteri

Biodisponibilità del ferro contenuto nel latte

Ferro contenuto nei latti: da 50 a 70 $\mu\text{g}/100\text{ ml}$

Latte materno: assorbito al 50% - Latte vaccino: assorbito al 10%



Acqua

**Contenuto medio di acqua nel latte umano
è circa 87- 90%**

**Idratazione ideale e sufficiente per il neonato/a,
specialmente nei primi 6 mesi**

I BENEFICI DELL'ALLATTAMENTO ESCLUSIVO PER I PRIMI 6 MESI

Definizione di allattamento esclusivo

L'allattamento è **esclusivo**
quando nessun altro liquido o solido
è dato al bambino/a
(con l'eccezione
di vitamine e sali minerali)

Benefici dell'allattamento

Relativi al latte materno:

- Costituito da una miscela di sostanze nutrienti perfette facilmente digeribile
- protegge dalle infezioni e dalla NEC del prematuro/a
- protegge dalle allergie (anche dalla IPLV)
- protegge dall'obesità e dal diabete
- protegge da alcuni tumori (linfomi, leucemie)
- previene (o ritarda) la celiachia
- modula il sistema immunitario, potenzia le vaccinazioni

Benefici dell'allattamento

Relativi all'allattamento:

- ▶ riduce il rischio di SIDS-Sudden Infant Death Syndrome (morte in culla)
- ▶ favorisce lo sviluppo intellettuale, emotivo e sociale del bambino/a
- ▶ facilita il rapporto con la madre
- ▶ contribuisce ad un miglior stato di salute della madre
- ▶ ritarda una nuova gravidanza (LAM)
- ▶ riduce i problemi ortodontici del bambino/a

Vantaggi dell'allattamento per madri/famiglie & società

- protezione dai tumori della sfera riproduttiva
- protezione contro l'osteoporosi
- pianificazione familiare (LAM)
- **empowerment** ed azione antagonista sulla depressione post-partum
- vantaggio ecologico
- riduzione costi familiari, sanitari e sociali

***Il vantaggio in salute
dell'allattamento
è
dose-dipendente***

Svantaggi e rischi dell'uso di latte formulato

- Contaminazione
- Infezioni
- Diarrea persistente
- Difficoltà digestive
- Allergie
- Diluizioni inadeguate

Il Codice Internazionale sulla Commercializzazione dei sostituti del Latte Materno

Indicazioni per l'applicazione

Scopo del CODICE

Articolo 1 : Finalità del Codice

- ▶ **Proteggere, promuovere e sostenere** l'allattamento.
- ▶ Assicurare che i **sostituti del Latte materno** siano usati in maniera appropriata e quando necessario.
- ▶ Fornire alle famiglie **informazioni adeguate** sull'alimentazione infantile.
- ▶ **Informazioni corrette alle madri** (non obbligo ad allattare).
- ▶ **Protezione ai bambini/e che ricevono sostituti del Latte Materno.**
- ▶ **Promozione commerciale appropriata dei sostituti del Latte materno.**

Si può leggere il Codice con le successive Risoluzioni qui:

http://www.unicef.it/Allegati/Codice_sostituti_latte_materno_11dic2012.pdf

Il Codice e la BFHI

Cosa copre?

Tutti i sostituti del latte materno, cioè qualsiasi prodotto che sia commercializzato e/o pubblicizzato come idoneo a sostituire il latte materno, del tutto o in parte:

- qualsiasi tipo di latte di formula, iniziale, di proseguimento e di crescita;
- latti speciali e fortificanti del latte materno per bambini/e con problemi medici o nutrizionali particolari;
- alimenti e bevande per bambini/e quando proposti per l'uso nel primo semestre di vita;
- biberon, tettarelle ed attrezzature connesse.
- Nella BFHI/BFCI le regole previste per i prodotti coperti dal Codice vengono estese anche a ciucci e paracapezzoli.

Il Codice e la BFHI/BFCI

Punti chiave

Le ditte non possono:

- promuovere e/o pubblicizzare i loro prodotti negli Ospedali, nei negozi o al pubblico;
- dare campioni gratuiti alle madri o dare forniture gratuite o sovvenzionate agli Ospedali o ai Reparti maternità;
- fare regali agli operatori sanitari o alle madri;
- promuovere i propri prodotti agli operatori sanitari;
- promuovere alimenti o bevande destinati a lattanti sotto i sei mesi di età;
- fornire informazioni fuorvianti;
- avere contatti diretti con le madri o le famiglie.

Ogni informazione fornita dalle ditte deve contenere solo dati scientifici e basati su evidenze.

Il Codice e la BFHI/BFCI

La legislazione italiana

L'Italia regola la commercializzazione dei sostituti del latte materno attraverso due decreti:

- **Decreto 9 aprile 2009, n. 82** - Regolamento concernente l'attuazione della direttiva 2006/141/CE per la parte riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento destinati alla Comunità europea ed all'esportazione presso Paesi terzi
<http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?attoCompleto=si&id=29174&page=>
- **Decreto legislativo 19 maggio 2011, n. 84** – Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 9 aprile 2009, n. 82, recante attuazione della direttiva 2006/141/CE per la parte riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento destinati alla Comunità europea ed all'esportazione presso i Paesi terzi. <http://www.trovanorme.salute.gov.it/dettaglioAtto?id=38502&completo=true>

La direttiva 2006/141/CE della Commissione Europea mira a “dare efficacia ai principi e agli scopi del Codice OMS”. Il testo della direttiva si trova qui: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006L0141&from=EN>

Passo 1

Il Codice

I vincoli richiesti per il Codice riguardano l'intera Struttura sanitaria

- ▶ Il rispetto del Codice deve riguardare **l'intera struttura ospedaliera**, non solo l'area Materno-Infantile
- ▶ UNICEF mette a disposizione una **Guida per operatori sanitari**:

Come agire nel rispetto del Codice Internazionale sulla Commercializzazione dei Sostituti del Latte Materno.

Passo 1

il Codice e la Politica

**L'impegno al rispetto del Codice va
esplicitato**

Deve essere sottoscritta un'**autocertificazione** su
carta intestata dell'Azienda con firma congiunta del
DG e dei Direttori delle strutture interessate



Passo 1

Il Codice e la Politica

Acquisto dei prodotti coperti dal Codice e altre attrezzature

Attuazione:

tutti i sostituti del latte materno, i biberon e le tettarelle, i ciucci, i paracapezzioli e i tiralatte devono essere acquistati attraverso i normali canali d'acquisto, fissando per ciascuna categoria di prodotti un prezzo minimo non simbolico ed evitando situazioni di monopolio; senza accettare campioni gratuiti o forniture a prezzi agevolati (vedi risoluzione AMS 39.28 94).

Passo 1

Il Codice e la Politica

Acquisto dei prodotti coperti dal Codice

Tutti i sostituti del latte materno, compresi i latti speciali ed i fortificanti del latte materno, nonché i presidi devono essere acquistati seguendo una procedura che garantisce:

- ✓ Una pluralità significativa delle ditte produttrici
- ✓ Una suddivisione equa del fabbisogno fra queste
- ✓ Un prezzo d'acquisto non simbolico

Il DM 82/09 all'art. 14 ricorda di:

- Vigilare affinché al momento della dimissione dal reparto non vengano forniti in omaggio prodotti o materiali in grado di interferire in qualunque modo con l'allattamento
- Le lettere di dimissione per i neonati/e non devono prevedere uno spazio predefinito per le prescrizioni dei «sostituti del latte materno»

Passo 1

Il Codice e la Politica

Promozione dei prodotti coperti dal Codice

All'interno delle strutture sanitarie non deve essere presente alcuna pubblicità dei prodotti coperti dal Codice.

UNICEF Italia raccomanda che quando all'Azienda sanitaria venga offerto un prodotto di qualsiasi tipo da utilizzare all'interno o da dare ai genitori ne sia prima verificata la fonte.

Se associata a qualsiasi ditta che rientra nel campo di applicazione del Codice, il prodotto deve essere rifiutato.

Ogni tipo di informazione aziendale (materiali/informazioni in forma scritta, multimedia, o presente in sito web, ecc.), compresi i materiali per i corsi di accompagnamento alla nascita, o altri materiali consegnati alle donne in gravidanza, deve essere corretta, appropriata, efficace e libera da promozioni dei sostituti del latte materno, biberon, tettarelle, ciucci e paracapezzoli.

Passo 1

Il Codice e la Politica

Linee guida sui requisiti per la pubblicità nella struttura BFHI

Non sono ammissibili pubblicità di:

1. latti artificiali in polvere o liquidi, (compresi formule “speciali”, latti “di proseguimento” o tipo 2 e latti “di crescita” o tipo 3),
2. prodotti che possano in tutto o in parte sostituirsi al latte materno, se presentati come adatti a bambini di età inferiore a 6 mesi (tisane, succhi, the, preparati liofilizzati, omogeneizzati, creme di cereali/riso, biscotti, acqua, ecc.),
3. tettarelle, ciucci, biberon e paracapezzoli. Non possono essere accettati campioni ridotti, né confezioni intere, dei prodotti coperti dal Codice, siano essi latti tipo 1-2-3 sia latti speciali come formule per prematuri, integratori, latti indicati per prevenire allergie o per trattare disturbi gastroenterici (coliche, reflusso, diarrea..)
4. come pure biberon, tettarelle, ciucci e paracapezzoli;
5. la sola presenza di questi campioni in una struttura sanitaria rappresenta una forma di pubblicità.
6. **Non sono ammissibili pubblicità, anche indirette o generiche** come il semplice logo, di ditte che producono sostituti del latte materno, biberon, tettarelle, ciucci e paracapezzoli. Ciò include qualsiasi canale pubblicitario come: poster, cartelloni e altri tipi di affissioni, opuscoli, dépliant, sito web, email ecc.

Passo 1

Il Codice e la Politica

Linee guida sui requisiti per la pubblicità nella struttura BFHI

Non è ammissibile l'esposizione e tanto meno la consegna di campione dei prodotti elencati, né altri alimenti complementari.

La distribuzione di campioni gratuiti e omaggi di alimenti per lattanti è vietata dalla legge (DM 82/09, Art. 12, comma 2).

Può essere ammessa la pubblicità ai **tiralatte** prodotti da ditte che non violano il Codice(a condizione che non contenga messaggi ambigui circa l'allattamento).

Passo 5

Il Codice e l'uso di sostituti del Latte Materno

- ▶ Effettuare una dimostrazione sulla preparazione, somministrazione e conservazione dei sostituti del latte materno alle madri che non allattano, in una **seduta individuale e riservata**, prima della dimissione, appurando che la madre sia in grado di effettuare correttamente la preparazione
- ▶ Conservare in modo “riservato” i sostituti del latte materno e il materiale necessario alla loro preparazione

Passo 1

Il Codice e la Politica

Linee guida sui requisiti per la pubblicità nella struttura BFHI

La pubblicità deve:

- a) La pubblicità non deve mai essere negativa nei confronti dell'allattamento o rappresentare l'alimentazione al biberon come normale per i bambini/e.
- b) Qualsiasi pubblicità deve essere coerente con i principi del programma Insieme per l'Allattamento

Passo 1

Il Codice e la Politica

Materiale per i genitori

Le ditte forniscono una miriade di istruzioni e/o aiuti per i genitori: volantini, linee telefoniche, applicazioni per smartphone, siti web, etc. e materiale per corsi durante il percorso nascita.

UNICEF Italia raccomanda che nessuno di questi prodotti venga offerto o consigliato ai genitori.

Ai genitori devono essere date informazioni valide ed accurate, indipendenti da qualsiasi interesse commerciale e basate su evidenze scientifiche.

Si riportano alcune fonti di sostegno con queste caratteristiche:

- ▶ ***Libretti dal progetto CCM sul sito <http://www.regione.lazio.it/lattematerno/>***
- ▶ ***Opuscolo dal sito del Ministero della Salute - [Il latte della mamma non si scorda mai](#)***
- ▶ ***Opuscolo per gli operatori dal sito del Ministero della Salute - [Allattamento al seno. Elementi informativi](#)***

Passo 1

Il Codice e la Politica

Contatti con i rappresentanti delle ditte

- ▶ Il contatto fra rappresentanti di ditte produttrici o distributori di sostituti del latte materno, biberon, tettarelle, paracapezzoli e ciucci con gli operatori deve avvenire, se possibile, in gruppo, su appuntamento ed autorizzato dal responsabile del servizio.
- ▶ Gli operatori, nel mantenere contatti con i rappresentanti delle ditte per qualsiasi motivo (per esempio, in occasione della presentazione di nuovi prodotti o di partecipazione a congressi), devono far sì che questi contatti non creino conflitti d'interesse con le iniziative amiche dei bambini/e
- ▶ in particolare nessun contatto diretto o indiretto con donne in gravidanza, madri e familiari

..."disciplinare le visite degli informatori scientifici dell'industria che produce e/o commercializza prodotti sostitutivi del latte materno presso gli ospedali e gli studi medici" (D.M. 82/2009)

Passo 1

Il Codice e la Politica

La legge riguardante i dipendenti pubblici

Art. 3

1...Il dipendente svolge i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l'interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare.

2. Il dipendente rispetta altresì i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza e agisce in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi.

Art. 4 Regali, compensi e altre utilità.

1. Il dipendente non chiede, né sollecita, per sé o per altri, regali o altre utilità.

2. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente [...]. In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il dipendente non chiede, per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio

Dal **"Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"** (Pubbl. G.U. n.129 del 4 giugno 2013 - [http:// www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/06/04/13G00104/sg](http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/06/04/13G00104/sg))

Passo 1

Il Codice

Codici Etici Professionali

I professionisti dovrebbero tenere in considerazione i seguenti codici deontologici nel contesto della commercializzazione dei sostituti.

- Codice di Deontologia Medica 2014 Art. 30 Conflitto di interessi
- Impegno di autoregolamentazione dei rapporti con l'industria dell'Associazione Culturale Pediatri
- Codice Deontologico dell'Ostetrica/o Art. 3.6
- Il Codice deontologico dell'Infermiere Articolo 17
- Posizione dell'ISSOP (International Society for Social Pediatrics and Child Health) sulla sponsorizzazione di pediatri e associazioni pediatriche da parte dell'industria alimentare
- Codice di Condotta Professionale per IBCLC- Consulenti Professionali in Allattamento

Come segnalare una violazione

L'AGCM ha un modulo online molto semplice da utilizzare per la presentazione delle denunce che potete trovare a :

<http://www.agcm.it/component/content/article/6448.html>

Oppure segnalare al numero verde 800166661

<http://www.agcm.it/stampa/news/4162-attivato-numero-verde-per-i-consumatori-si-potranno-segnalare-pubblicita-ingannevoli-e-pratiche-commerciali-scorrette.html>

Passo 1

Il Codice

Indipendenza e trasparenza dell'operatore sanitario

Partecipazione a un convegno o evento formativo sponsorizzato:

- ▶ se è rilevante per la sua formazione
- ▶ se è compatibile con il codice deontologico
- ▶ e con l'esercizio della professione basato sulle prove di efficacia
- ▶ se non ha ricadute negative sulla struttura di appartenenza, sui valori dichiarati e sulle relazioni con le famiglie
- ▶ se non rischia di essere strumentalizzata da una ditta
- ▶ senza ricevere compensi.

Passo 1

Il Codice

Formazione per gli operatori sanitari e Codice

In caso di inviti a partecipare o collaborare a congressi ed attività formative sia come discente che in forma attiva, nonché in attività editoriali o pubblicitarie, l'operatore/operatrice deve valutare:

- ▶ la presenza di violazioni del Codice Internazionale, il profilo di opportunità della partecipazione in base alla rilevanza scientifica, professionale e alla valenza promozionale dell'attività richiesta
- ▶ la compatibilità con il codice deontologico e con un comportamento professionale basato sulle prove di efficacia;
- ▶ come si rifletterà la partecipazione sull'ente di appartenenza e sui valori espressi nella politica aziendale;
- ▶ l'effetto che potrebbe avere la partecipazione sui pazienti e sulle famiglie.

Passo 1

Il Codice

Formazione per gli operatori sanitari e il Codice

Nel caso di consenso alla partecipazione o attività formative l'operatore/operatrice sanitario dovrà:

- ▶ rispettare il Codice Internazionale per la Commercializzazione dei Sostituti del Latte Materno e quindi non accettare pagamenti, rimborsi o regali;
- ▶ dichiarare la propria posizione rispetto al Codice (p. es. dichiarazione conflitto interessi ad inizio presentazione);
- ▶ partecipare alle attività negli eventi rifiutando ogni forma di finanziamento.

Passo 1

Il Codice

Contributi finanziari dalle ditte per ricerca e formazione

Eventuali contributi finanziari per la formazione, la ricerca, l'acquisto di attrezzature possono essere versati dalle compagnie produttrici di prodotti coperti dal Codice Internazionale, nei fondi istituzionali ciechi e saranno gestiti dalla Direzione Aziendale.

La compagnia dovrà impegnarsi per iscritto a rinunciare all'uso del contributo per iniziative pubblicitarie.

In nessun caso il contributo dovrà essere legato al singolo operatore.


In tema di ricerca è necessario non compromettere le buone pratiche per l'allattamento o il diritto dei genitori di fare scelte pienamente informate su come nutrire il proprio bambino/a.

Si raccomanda che il gruppo di ricerca sia durante la pianificazione sia durante lo svolgimento della ricerca consulti il referente della BFHI.

Passo 2

Il Codice e la Formazione

...” La formazione svolge un ruolo importante nel processo di interiorizzazione da parte degli operatori delle motivazioni profonde che sono alla base del Codice e quindi del loro ruolo nella sua attuazione”...




Lo “spirito” del Codice e la BFHI/BFCI

- ▶ attenzione e rispetto per la fisiologia
- ▶ non creare falsi problemi medici
- ▶ non indurre falsi bisogni
- ▶ evitare prescrizioni inutili
- ▶ non essere veicolo di messaggi pubblicitari di qualsiasi tipo

Come arriva il latte dal seno al bambino/a?

Anatomia del seno in allattamento



Anatomia della mammella durante l'allattamento


Struttura esterna

L'areola è un'area di cute pigmentata, contiene le ghiandole di Montgomery che producono una sostanza sebacea, lubrificante in gravidanza ed in allattamento, proteggono l'areola e guidano l'orientamento olfattivo del neonato/a.

Il capezzolo, è ricoperto da epitelio e contiene fibre muscolari lisce con azione pseudo-sfinteriale per controllare la fuoriuscita del latte.

Durante l'allattamento, il capezzolo deve essere spinto in profondità nella bocca per evitare dolore e favorire il drenaggio.

Anatomia del seno in allattamento



Anatomia della mammella durante l'allattamento

Struttura ghiandolare

La mammella è una ghiandola secretiva, composta, a prevalente tessuto ghiandolare.

E' organizzata in lobi, ognuno dei quali diviso in lobuli, che contengono alveoli e dotti.

Gli alveoli contengono le cellule acinose che producono latte, circondate dalle cellule mioepiteliali che contraendosi espellono il latte lungo i dotti.

I dotti galattofori rappresentano una rete di canali che trasportano il latte dagli alveoli confluenndo in dotti più grandi: studi recenti indicano che i dotti non si dilatano in «seni galattoferi» fissi (seni serbatoi) ma si espandono e contraggono dinamicamente durante la poppata.

Anatomia della mammella durante l'allattamento

Capezzolo


Cellule
muscolari

L'ossitocina
ne provoca la
contrazione

Vasi sanguigni


Areola
Ghiandole di
Montgomery

Legami di Cooper
Linfa
Nervi



Dotti galattofori

Alveoli
Cellule secernenti
latte
La prolattina induce
la secrezione del latte



Tessuto di supporto e
grasso

Anatomia della mammella durante l'allattamento

La componente ghiandolare è presente in gran parte a livello dell'areola, sotto e nella zona circostante.

La mammella è riccamente vascolarizzata.

Gli alveoli sono avvolti da arteriole che portano le sostanze del sangue, che passano anche nel latte.

Le vene sono organizzate in modo simile intorno al capezzolo.

La linfa drena dalle due mammelle nei linfonodi ascellari e in quelle del mediastino.

Le terminazioni nervose permettono la trasmissioni dei segnali dal seno al cervello per l'innescio del rilascio di ormoni necessari per la produzione di latte.

Il tessuto di sostegno e il tessuto adiposo sono responsabili del volume e della forma del seno.

Anatomia della mammella durante l'allattamento

La percentuale di tessuto adiposo è di supporto e non influisce sulla produzione di latte:

la dimensione delle mammelle non influisce sulla possibilità di allattare e di produrre latte in quantità adeguata alle esigenze del/la bambino/a.

Funzione ormonale della mammella



L'ossitocina **provoca**
la **contrazione delle cellule**
muscolari che circondano gli
alveoli

La prolattina **induce gli**
alveoli alla secrezione
del latte

La produzione di latte è sotto il controllo ormonale.

Funzione ormonale della mammella

Prolattina

La prolattina è un ormone adenoipofisario che induce gli alveoli a produrre latte.


Il suo picco viene raggiunto nei trenta minuti successivi all'inizio della poppata per favorire la produzione per la poppata successiva.

E' più elevata durante la notte.

In gravidanza influenza la sintesi del fattore surfattante del polmone fetale.

Esercita un ruolo nella biosintesi del latte (sintesi della caseina).

Prolattina



**La prolattina è
secreta in
maggior quantità
durante la notte**

**Sopprime
l'ovulazione**

**Entra in circolo DOPO la poppata per produrre il latte della
poppata SUCCESSIVA**

Funzione ormonale della mammella


Ossitocina

Ormone prodotto dalla neuroipofisi

E' implicata nella lattogenesi a livello della ghiandola mammaria, induce la contrazione delle cellule mioepiteliali che avvolgono gli alveoli ed i dotti ghiandolari, provocando l'eiezione del latte.

Ciò avviene più volte in un'unica poppata con variabilità (2,5 eiezioni a poppata/ 9 anche nella stessa poppata).

Riflesso dell'Ossitocina



Agisce PRIMA o DURANTE la poppata e permette la fuoriuscita del latte

Funzione ormonale della mammella

Ossitocina

STIMOLANO IL RIFLESSO DELL'OSSITOCINA

Sentirsi a proprio agio

Pensare teneramente al
bambino

Udirne i suoni

Guardarlo



OSTACOLANO IL RIFLESSO DELL'OSSITOCINA

Stress

Dolore

Preoccupazione

Insicurezza

Funzione ormonale della mammella

Ossitocina

Il riflesso ossitocinico si attiva in presenza di pensieri positivi sul bambino/a, di sguardi e carezze al piccolo/a.

Viene inibito dallo stress di qualsiasi causa (dolore, ansia, dubbi, uso di nicotina ed alcool).

Fondamentale è il sostegno alle madri in post-partum e alla dimissione.


Ancor più se il neonato/a non viene dimesso insieme alla madre.

Il modo di parlare con la madre può favorire il flusso del latte, usando le abilità della comunicazione.

Fattori che inibiscono l'allattamento

FIL

**Feedback di Inibizione
della Lattazione**



**Se il seno non è svuotato la secrezione di latte
si ferma!**

Funzione ormonale della mammella

Fattore di Inibizione della Lattazione FIL

- ▶ Prodotto da secrezione autocrina delle cellule ghiandolari.
- ▶ E' una proteina del latte che agisce a livello periferico.
- ▶ Non circola nel sangue, è un fattore locale.
- ▶ In sua presenza la produzione di latte è limitata.
- ▶ Svolge la funzione di bloccare la produzione di altro latte.
- ▶ Se il seno viene svuotato, il FIL non agisce perché viene continuamente rimosso.
- ▶ Una mammella produce più latte se viene svuotata più dell'altra.
- ▶ La quantità di latte prodotta, quindi, dipende dalla quantità di latte rimossa.

Funzione ormonale della mammella

Fattore di Inibizione della Lattazione FIL

Come evitare l'inibizione alla produzione del latte da parte del FIL:

- ▶ Fare in modo che il bambino/a sia attaccato in maniera adeguata
- ▶ Incoraggiare le poppate frequenti
- ▶ Lasciare che il bambino/a succhi quanto desidera per ciascun seno
- ▶ Lasciare che il bambino/a termini con un seno prima di offrirgli l'altro
- ▶ Spremere il seno se il bambino/a al fine di garantire che la produzione continui

Funzione produttiva della mammella

Lattazione

La montata lattea avviene in terza e quarta giornata

Le tre fasi della lattazione sono:

- ▶ Galattogenesi
- ▶ Galattopoiesi
- ▶ Lattoespulsione

Funzione produttiva della mammella

Lattazione

Galattogenesi

- ▶ Dopo il secondamento il livello ematico di estrogeni e progesterone inizia a diminuire fino a provocare l'insorgenza della montata lattea
- ▶ La prolattina è l'ormone lattogeno più importante
- ▶ L'azione sinergica di altri ormoni gioca un ruolo fondamentale

Funzione produttiva della mammella

Lattazione

Galattopoiesi

- ▶ Il mantenimento della secrezione lattea è basato sull'esistenza di un meccanismo riflesso secretorio attivato dalla suzione
- ▶ Lo stimolo sul capezzolo provoca l'inibizione del neurotrasmettitore dopamina a livello ipotalamico
- ▶ Immissione di prolattina in circolo


Funzione produttiva della mammella

Lattazione

Lattoespulsione

- ▶ Con la suzione, lo stimolo sensitivo del capezzolo attiva un riflesso mammillo-postipofisario
- ▶ Immissione di ossitocina che provoca la contrazione delle cellule mioepiteliali
- ▶ Emissione di latte

Allattamento come processo interattivo



La **SUZIONE** regola la produzione di prolattina, il riflesso ossitocinico e la rimozione del FIL dal seno.

Per la produzione di latte è necessario che il bambino/a succhi spesso ed in modo corretto per rimuovere e ricevere il latte.

La suzione del/della bambino/a controlla tutto!



Controindicazioni all'allattamento vere e false

obiettivo

**Conoscere le vere controindicazioni su
linee guida accettate**

Controindicazioni all'allattamento

Le controindicazioni all'allattamento possono derivare da:

- Salute della madre
- Uso di alcuni farmaci
- Malattie di cui è affetto il bambino/a

In caso di dubbi e difficoltà è bene che la madre consulti il medico o un/una consulente professionale in allattamento.

Controindicazioni di origine materna

- **Infezione materna da HIV:** nei paesi sviluppati dove l'acqua potabile e le alternative al latte materno sono facilmente accessibili, rappresenta una controindicazione assoluta. Le indicazioni fornite dall'OMS sono differenti per i Paesi in via di sviluppo
- **Infezione da HTLV-1 e HTLV-2** (virus linfotropi umani a cellule T che possono causare leucemia o patologie neurologiche)
- **Malattie gravemente debilitanti:** sepsi, nefrite cronica, tifo, tubercolosi in fase attiva

False controindicazioni (ostacoli)

- Malattie materne comuni: **Herpes Simplex** (tranne in presenza di lesioni attive direttamente sul capezzolo)
- Madre positiva per antigene **EPATITE B**: qualora il neonato abbia ricevuto immunoglobuline specifiche e vaccinazione anti-epatite B subito dopo la nascita.
- **EPATITE C**: a meno che la donna non sia infettata contemporaneamente con il virus HIV
- Infezione materna da **virus SARS-CoV-2**: la madre e il bambino non devono essere separati, salvo i casi in cui i sintomi dell'infezione materna siano gravi. Si raccomanda l'uso di mascherina e il lavaggio delle mani
- **Malattie materne lievi** (febbre, influenza, infezioni urinarie, diarrea, mastite)
- **Ittero da latte materno**
- **Problemi oculari materni** (es. miopia)
- **Ipotiroidismo materno**
- **Anestesia generale o locale**
- **Ricomparsa delle mestruazioni**
- **Stato di gravidanza**

False controindicazioni nelle procedure mediche

- **Anestesia:** né l'anestesia locale, né quella loco-regionale (epidurale, spinale), né l'anestesia generale giustificano la sospensione dell'allattamento o il gettare via il primo latte.
- **Mezzi di contrasto m.d.c. (iodati ed a base di gadolinio):** passano in quote trascurabili. Non è necessario buttare il primo latte, né sospendere l'allattamento per 12-48h. Tutti i m.d.c. sono compatibili con l'allattamento tranne: gadopentetato dimeglumina, gadodiamide, gadoversetamide (rischio di fibrosi sistemica nefrogenica)
- **Radionuclidi:** consultare medico di medicina nucleare per informazione sull'emivita del radionuclide; gettare il latte spremuto per lo stretto tempo suggerito dallo stesso medico. Sospendere l'allattamento diretto al seno, ma drenare frequentemente il seno per mantenere la produzione ed evitare l'ingorgo/mastite.

Controindicazioni da uso dei farmaci

Secondarie all'uso dei seguenti farmaci:

- **Farmaci anti-tumorali** (ciclofosfamide, ciclosporina, doxorubicina, metotrexate)
- **Sostanze radioattive utilizzate in radiodiagnostica** (limitatamente alla loro durata d'azione)
- **Anti-tiroidei** (diversi dal tiouracile)

Prudenza a non utilizzare queste sostanze per seri effetti collaterali:

- **Sostanze stupefacenti:** anfetamine, cocaine, eroina, marijuna, metadone, LDS
- **Ergotamina**
- **Litio**
- **Metimazolo**
- **Amiodarone**
- **Aipprofloxacin, tetraciclina, sulfamidici** (se lattante ha deficit di G6PD, neonati pretermine, se presente ittero)

Controindicazioni all'allattamento da malattie del/della bambino/a

- **Galattosemia:** rara malattia metabolica del neonato che impedisce di metabolizzare il galattosio contenuto nel latte
- **Fenilchetonuria:** rara malattia metabolica enzimatica in cui sono ammesse piccole quantità di latte materno
- **Malattia delle urine a sciroppo d'acero (MSUD):** altra rara malattia metabolica congenita (ammesse piccole quantità di latte materno)

Prevenzione e Ragioni mediche accettabili per l'uso di Sostituti del latte materno



Preparazione formula



Farmaci ed allattamento

Si stima che tra il 65 ed il 95% delle donne in allattamento assuma farmaci, il cui uso solleva la problematica della sicurezza in corso di allattamento.

In caso di malattia della madre può essere valutata l'opportunità di iniziare una terapia farmacologica o di non interromperla qualora essa sia già in atto.

Ciò solleva la problematica della sicurezza per il lattante, relativamente ai possibili effetti conseguenti al passaggio del farmaco nel latte materno.

Un'informazione non adeguata può indurre un'inutile sospensione dell'allattamento o la rinuncia alla cura da parte della madre, oppure il ricorso ad automedicazione o terapie alternative che non possono essere intese come più efficaci e più sicure.

L'uso dei farmaci rappresenta una controindicazione all'allattamento solo quando esistono prove documentate in merito.



Farmaci ed allattamento

Conseguenze della sospensione dell'allattamento

L'uso di un farmaco in corso di allattamento deve tener conto di ciò che implica l'eventuale controindicazione ad allattare:

- la perdita di alcuni documentati benefici sia per la madre che per il/la bambino/a;
- il disagio che anche una breve sospensione dell'allattamento può provocare nel bambino/a;
- l'impegno aggiuntivo per la madre di estrarre il latte dal seno;
- il mantenimento della produzione del latte tramite spremitura (manuale/meccanica);
- il calo della produzione di latte.

Farmaci ed allattamento

Passaggio dei farmaci nel latte materno

E' favorito prevalentemente da:

- lunga emivita del farmaco,
- basso peso molecolare,
- basso legame alle proteine plasmatiche,
- elevate liposolubilità.

La quantità di farmaco assunta dal lattante è influenzata da:

- via di somministrazione,
- quantità di latte materno assunta giornalmente dal lattante,
- percentuale del farmaco assorbita a livello gastroenterico (biodisponibilità).

Caratteristiche del lattante:

- prematurità,
- maturazione del metabolismo epatico,
- filtrazione renale e maturazione della barriera ematoencefalica.

Farmaci ed allattamento

Il passaggio di farmaci attraverso il latte comporta, di regola, una assunzione di farmaci da parte del lattante pari a l'**1% della dose assunta dalla madre.**



Farmaci ed allattamento

**C'è davvero un conflitto di interessi
tra salute della madre e salute del
bambino allattato?**



Fattori che influenzano il passaggio di un farmaco nel latte materno

- ➔ **via di somministrazione alla madre**
- ➔ **legame alle proteine plasmatiche (ideale >90%) (es. limite litio, warfarin)**
- ➔ **livello plasmatico e rapporto M:P (M=milk) (preferire M:P <1)**
- ➔ **dose quotidiana introdotta dal lattante**
- ➔ **emivita (evitare forme retard)**

Farmaci ed allattamento

Approccio alla valutazione dell'uso dei farmaci in allattamento

Il medico dovrebbe attuare una valutazione metodologicamente corretta sull'eventuale rischio del singolo farmaco assunto in allattamento.

Non si dovrebbe ritenere l'assunzione di un farmaco in allattamento in linea di principio con la tutela di salute del lattante.

L'approccio non dovrebbe essere prioritariamente improntato alla medicina difensiva (timore medico-legale).

Particolare attenzione va posta al bambino/a in allattamento esclusivo, soprattutto nei primi due mesi di vita e nei neonati pretermine.

Farmaci ed allattamento

Approccio alla valutazione dell'uso dei farmaci in allattamento

La scelta della terapia dovrebbe basarsi su comprovata esperienza clinica in allattamento con attenzione ad evitare i farmaci con lunga emivita o lunga durata di azione.

E' preferibile la via di somministrazione che riduca al minimo il passaggio nel latte.

Dovrebbero essere scelti farmaci non assorbiti o poco assorbiti per via gastrointestinale e con minimo dosaggio terapeutico efficace.

Se un farmaco è assolutamente controindicato in allattamento, in assenza di alternative compatibili, si può interrompere l'allattamento per poi riprenderlo appena possibile.

Nei casi più complessi o con farmaci di recente autorizzazione, la valutazione del beneficio/rischio, può avvalersi al ricorso dei servizi di informazione sull'uso dei farmaci in allattamento/gravidanza (TIS, Teratology Information Service).

Farmaci ed allattamento

Decidere la terapia farmacologica in allattamento

Il medico deve essere consapevole che la prescrizione di un farmaco in allattamento è una decisione da prendere, valutando correttamente tutti i data scientifici disponibili.

La donna che allatta deve ricevere informazioni appropriate per facilitare una scelta informata e consapevole.

La decisione tra terapia farmacologica ed eventuale sospensione dell'allattamento in genere non ha carattere di urgenza.

Non è opportuno ritardare l'avvio dell'allattamento in attesa della montata lattea.

Si ricorda che la quantità di farmaco potenzialmente assunte dal neonato/a col colostro sono minime.

E' necessario fornire un parere medico dopo ulteriore approfondimento per fornire un consiglio meditato e documentato, preferibilmente entro 24 ore.

Farmaci ed allattamento

Gestione dell'uso dei farmaci durante l'allattamento

Prima di consigliare alla madre un prodotto medicinale, deve essere considerato se la scelta è stato del farmaco più appropriato.

La madre deve ricevere spiegazioni sui dati scientifici disponibili e compatibilità con l'allattamento.

Va suggerita l'assunzione subito dopo la fine di una poppata, per consentire il massimo di metabolizzazione da parte della madre (picco ematico 1-3 ore dall'assunzione orale).

Nessun farmaco può essere considerato assolutamente sicuro, per cui va consigliato di monitorare il bambino/a per la possibile insorgenza di reazioni avverse (soprattutto nei primi 2 mesi, per effetto sistema nervoso centrale e apparato gastroenterico).

Eventuali reazioni avverse vanno segnalate alla Rete Nazionale di Farmaco Vigilanza.

Farmaci ed allattamento

Farmaci ad azione sul Sistema Nervoso Centrale

I farmaci psicotropi sono tra quelli con le più frequenti richieste di consulenza.

Si riportano alcune raccomandazioni di carattere generale:

- In caso di terapia che agisce sul SNC l'allattamento al seno non è automaticamente controindicato.
- Bisogna considerare l'effetto positivo del farmaco sulla stabilizzazione dei sintomi materni e, in maniera indiretta, sulla relazione madre – bambino/a.
- I farmaci psicotropi compatibili con l'allattamento richiedono comunque un'attenta sorveglianza clinica sul bambino/a ed eventuale dosaggio del livello plasmatico se compaiono dei sintomi (sonnolenza, disturbi alimentari, alterazione del sonno/veglia, irritabilità).
- L'assunzione contemporanea di più farmaci che agiscono sul SNC aumenta il rischio di effetti collaterali dovuti alla loro interazione.

Informarsi su farmaci ed allattamento

Hale's Medication & Mothers' Milk


Un manuale di farmacologia in allattamento 2025-2026
di Thomas W. Hale e Kaytlin Krutsch

Questa edizione offre le informazioni più aggiornate e **basate su evidenze** disponibili e rappresenta uno standard per la sicurezza dei farmaci in allattamento.

Sono presentate le **Categorie di Rischio per la Lattazione (LRC)** del Dr. Thomas W. Hale, che forniscono informazioni essenziali, elencando **alternative sicure di farmaci** che potranno essere utilizzate.

Rappresenta una risorsa indispensabile per i professionisti sanitari ai fini di garantire **la sicurezza e il benessere sia della madre che del neonato/a**.

Sono inclusi nuovi farmaci per la perdita di peso, l'insufficienza cardiaca, l'ansia e la depressione post-partum.



Informarsi su farmaci ed allattamento

Classificazione di Thomas Hale

CLASSE DI RISCHIO	
L 1	Il più sicuro , farmaci studiati su un ampio numero di madri che allattano senza effetti negativi sul lattante. Il farmaco non è assorbito dal lattante o la quantità nel latte è insignificante (es. amoxicillina, paracetamolo).
L 2	Più sicuro , farmaci studiati su un numero limitato di madri, oppure farmaci con evidenze di rischio minimo o assente nel lattante.
L 3	Moderatamente sicuro , farmaci non studiati in modo controllato o per i quali esistono evidenze di possibili rischi minimi. La somministrazione richiede cautela e deve essere fatta solo se il beneficio giustifica il rischio(es. codeina).
L 4	Potenzialmente pericoloso , farmaci per i quali esistono prove di rischio per il lattante o per la produzione di latte ma i cui benefici possono essere superiore al rischio (monitorare il bambino/a).
L 5	Controindicato , farmaci con rischi documentati e certi per il bambino/a. L'assunzione è controindicata durante l'allattamento (es. amiodarone, chemioterapici, litio).

Informarsi su farmaci ed allattamento

- ▶ **Drugs and Lactation Database (LactMed)**, parte della US National Library of Medicine, Toxicology Data Network (TOXNET) - <http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?LACT>
- ▶ **E-lactancia**, progetto di Apilam (associazione per la promozione, la cultura e la ricerca scientifica sull'allattamento) - <http://www.e-lactancia.org>
- ▶ **MotherToBaby**, servizio svolto dall'organizzazione Organization of Teratology Information Specialists (OTIS) - <https://mothertobaby.org>
- ▶ **Portale dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA)** – <http://www.farmaciegravidanza.gov.it>

Informarsi su farmaci ed allattamento

Centri italiani di informazione sulla sicurezza d'uso dei farmaci in corso di allattamento

Città ed Istituto	Telefono/ e-mail
BERGAMO (ENTIS) UOSD Centro Antiveneni e Tossicologia, Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII, piazza OMS 1, 24127 Bergamo	800.883300 035.2675096 035.2674835 (fax) clintox@asst-pg23.it www.asst-pg23.it/section/259/Tossicologia_Centro_antiveneni
FIRENZE (ENTIS) Centro di Riferimento Regionale di Tossicologia Perinatale, Tossicologia Medica, Azienda Ospedaliero-Universitaria, Careggi, largo Brambilla 3, 50134 Firenze	Per il pubblico: 055.7946731 Per operatori sanitari: 055.7946859 / 055.7946160 (fax) toxper@aou-careggi.toscana.it www.aou-careggi.toscana.it/internet/index.php?option=com_content&view=article&id=603&catid=92&Itemid=909&lang=it
PADOVA (ENTIS) CEPIG Servizio di Informazione Teratologica, Genetica Clinica ed Epidemiologica, Azienda Ospedaliera di Padova, via Giustiniani 3, 35128 Padova	049.8213513 049 8214422 049 8211425 (fax 24/24 h) ambulatorio.genetica@sanita.padova.it www.sanita.padova.it/sez,2672
ROMA (ENTIS) "Filo Rosso", Roma Telefono Rosso, Istituto di Clinica Ostetrica e Ginecologica, Dipartimento per la Tutela della Salute della Donna e della Vita Nascente, largo A. Gemelli 8, 00168 Roma	06.5800897 06 3050077 06 30156572 (fax) telefonorosso@rm.unicatt.it www.policlinicogemelli.it/Policlinico_Gemelli.aspx?p=A7D5578C-8E11-4314-A2FDA4D8F9EC4E76&n=S_telefono_rosso

Prevenzione e Ragioni mediche accettabili per l'uso di sostituti del latte materno



Ragioni mediche accettabili per l'uso di sostituti del latte materno

Bambini minori di un anno per i quali il latte materno è l'opzione migliore, ma che possono aver bisogno di un supplemento per un periodo limitato

1. **Ipoglicemia** documentata da misurazioni di Laboratorio o EGA non responsiva ad appropriati interventi (frequenti poppate con trasferimento di latte e/o applicazione di gel di destrosio 40%).
2. **Iperbilirubinemia associata a ridotto intake** di latte nonostante la messa in atto di opportuni interventi e calo ponderale che continua con ridotta emissione di feci/urine.

Ragioni mediche accettabili per l'uso di sostituti del latte materno

- **Evidenza clinica e/o laboratoristica di disidratazione** significativa (es ipersodiemia, suzione debole, letargia, ecc..)
- **Calo ponderale** : un calo entro 8-10% potrebbe essere fisiologico se il neonato è in benessere e fa poppate efficaci; indica comunque di aumentare il sostegno e vigilanza della coppia madre-neonato.
Un calo $\geq 10\%$ potrebbe essere spia di inadeguato trasferimento e/o ridotta produzione di latte. Questa situazione pone indicazione ad una attenta rivalutazione clinica del neonato e delle varie fasi dell'allattamento per eventuale integrazione
- **Ritardata o ridotta motilità intestinale** (< 3 evacuazioni in 4° giornata e/o feci ancora di aspetto meconiale in 5° giornata) e/o ridotta produzione di urine: indicano insufficiente trasferimento o produzione di latte

A rischio più elevato per le suddette condizioni sono i neonati VLBW/LBW, pretermine e neonati con fattori di rischio per ipoglicemia. Per queste categorie, sono richiesti sostegno e vigilanza maggiori

Allattamento e HIV

L'opzione più appropriata per una madre HIV positiva dipende dalle sue circostanze di salute, da quelle del bambino/a, ma anche dai servizi sanitari disponibili, dal counselling e dal sostegno che potrebbe ricevere.

Nei paesi a basso reddito in cui non vengono garantiti i requisiti di un'alimentazione AFASS, l'allattamento esclusivo è raccomandato per i primi 6 mesi.

L'allattamento misto nei primi 6 mesi (latte materno+sostituto) dev'essere nei limiti del possibile evitato.

Nelle realtà in cui l'alimentazione sostitutiva è AFASS, si raccomanda l'astensione totale dall'allattamento per azzerare il rischio di trasmissione attraverso il latte materno.

Se una madre manifestasse la volontà di allattare deve essere fornito un counseling individuale per fornire le informazioni più aggiornate sulla base delle evidenze scientifiche disponibili circa i rischi e benefici di questa scelta.

- **Infezione da HTLV:** l'allattamento è controindicato in maniera assoluta

Infezione da virus e allattamento

- **Herpes Simplex tipo 1 (HSV-1):** Si deve evitare il contatto diretto tra le lesioni del seno della madre e la bocca del bambino/a fino a guarigione completa delle lesioni attive; se le lesioni sono monolaterali, l'allattamento può proseguire dal lato non affetto.
- **Infezione da SARS -Cov2:** si considera sicuro il contatto intimo tra madre COVID-19 positiva e il bambino/a allattato, sempre che vengano seguite le norme di controllo della trasmissione del virus (mascherine, accurata igiene delle mani).
- **Epatite B e C :** per i nati da madri HBV-positive i neonati/e devono ricevere il vaccino anti HBV + immunoglobuline entro le prime 12-24 ore dalla nascita. Per entrambe le infezioni, in caso di ragadi sanguinanti prendere in considerazione la sospensione temporanea dell'attacco al seno dal lato colpito sino a guarigione.

Tubercolosi e allattamento

In caso di malattia materna attiva (bacillifera) dato il rischio di contagio per via aerea, è raccomandata la separazione temporanea di madre e neonato sino a due settimane dall'inizio della terapia antitubercolare durante le quali il latte materno può essere estratto e somministrato al neonato/a.

Dopo tale periodo e con negativizzazione dell'escreato materno, il neonato/a può essere attaccato al seno.

Porre attenzione alla presenza di segni di mastite tubercolare che controindicano l'allattamento sino a guarigione.

Allattamento in caso di malattia

Rischi della sospensione improvvisa dell'allattamento:

- Ingorgo del seno e dolore
- Riduzione della produzione di latte con difficoltà alla ripresa
- Stress del bambino
- Interruzione dei benefici dell'allattamento
- Alimentazione artificiale

Allattamento in caso di malattia

- ➔ Può continuare in quasi tutti i casi
- ➔ Ridurre al minimo la separazione madre-bambino/a
- ➔ Garantire il necessario sostegno ed aiuto pratico
- ➔ Aiutare la spremitura manuale del seno
- ➔ Prediligere trattamenti e farmaci compatibili con l'allattamento
- ➔ Aiutare la ripresa dell'allattamento in caso di interruzione.

L'allattamento in caso di malattia materna è davvero controindicato o è la situazione che lo rende difficile?

Prevenzione e Ragioni mediche accettabili per l'uso di sostituti del latte materno



Allattamento in caso di malattia

**La continuità del rapporto madre-bambino/a e
il mantenimento dell'allattamento in caso
di ricovero ospedaliero**

Indicazioni a cura del Gruppo multi-professionale 2020-2021

Tavolo Tecnico Operativo Interdisciplinare per la promozione
dell'allattamento al seno "TAS" del Ministero della Salute, Comitato
Italiano per UNICEF...

Messaggio chiave

***È possibile tutelare
anche la salute della madre,
oltre a quella del/della bambino/a,
mantenendo o provando a mantenere
l'allattamento
in corso di malattia***

